

## STUDIO DEI TEMPI DI TRANSITO

Data

ora

<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>
<b>LUOGO E DATA DI NASCITA</b>	<b>INDIRIZZO</b>
<b>CITTA'</b>	<b>REPARTO</b>
<b>DIAGNOSI CLINICA</b>	

Data e ora ultima defecazione

--	--

Data e ora assunzione Pillole radio-opache

--	--

Compilazione a cura del Tecnico e del Radiologo				
Rx n°	Data	Ora	Numero e sede dei markers	Ora defecazione
1				
2				
3				
4				
5				

### RISULTATO

1- Tempo di transito totale:

2- Tempo di transito parziale

I quadrante

II quadrante

III quadrante

_____
_____
_____

L'esame va eseguito per un massimo di 4 giorni

### **Note informative**

Fare assumere al paziente 30 pillole radiopache alle ore 12.00 durante il pasto, mettendole in una cialda oppure mescolandole nel cibo (giorno 0).

Eseguire una radiografia in bianco dell'addome dopo 24 ore dall'assunzione delle pillole radiopache (giorno 1), annotare l'ora dell'eventuale defecazione.

Ripetere la radiografia dell'addome ogni giorno alla stessa ora, annotare sempre l'ora dell'eventuale defecazione. Normalmente i controlli radiografici sono quattro salvo diverse indicazioni del Medico Radiologo.

La dieta del paziente deve contenere almeno 10.15 gr/die di scorie indigeribili (per es. 20.30 gr. di crusca).

Non devono assolutamente essere prescritti lassativi o supposte né eseguiti clisteri fino al completamento dell'esame.

Durante il periodo di esecuzione della prova il paziente non deve essere sottoposto ad altri esami contrastografici.

Non prescrivere farmaci stiptizzanti (oppiacei es. Codeina e morfina, difenossilato, antistaminici, anticolinergici, antidepressivi triciclici, clonidina, benzodiazepine e antidepressivi alfa-adrenergici).

E' preferibile che l'esame si svolga al di fuori del periodo mestruale.